

儿童多系统炎症综合症 (MIS-C)

(Multisystem Inflammatory Syndrome in Children (MIS-C))

家长须知

关于 MIS-C

儿童多系统炎症综合征 (MIS-C) 是一种罕见但严重的 COVID-19 相关疾病。MIS-C 会导致心脏、肺部、肾脏、脑部、皮肤、眼睛或胃肠道器官发炎。

导致 MIS-C 的原因是什么

我们仍在了解导致 MIS-C 的原因。已知的是，患上 MIS-C 的儿童曾患有 COVID-19 或与 COVID-19 患者有过密切接触。MIS-C 属于严重疾病，但确诊的儿童通过及时的医疗护理能够康复。

如果认为孩子患有 MIS-C

如果您的孩子出现 MIS-C 的症状，请联系医生或医疗服务提供者。如果没有医生或医疗服务提供者，请拨打 211 或访问网站 211wisconsin.communityyo.org 以获取可提供帮助的资源。

MIS-C 的症状如下：

- 腹痛
- 疲倦
- 发烧
- 呕吐
- 皮疹
- 腹泻
- 颈痛
- 眼部血丝

如果您的孩子出现以下任何
紧急警示症状，请立即拨打
911 或前往急诊室：



- 呼吸急促/困难
- 无法消退的胸部疼痛或压力。
- 唇部或脸部变色
- 无法醒来或保持清醒
- 意识模糊
- 剧烈腹痛



MIS-C 的诊断和治疗

医生或其他医疗服务提供者可能会进行不同的检查以寻找炎症，例如：

- 腹部超声
- 血液检查
- 胸部 x 光
- 超声心动图（心脏超声）

患有 MIS-C 的儿童须在医院接受治疗，并可能被送往儿科重症监护病房。

医生会给您的孩子服用药物或液体以使其感觉好转，并治疗炎症。

保护您的孩子免受 COVID-19 感染

预防 MIS-C 的最佳做法是采取措施，以保护您的孩子免受 COVID-19 影响。我们认识到，有些人可能没有权利或资源，无法参与某些预防措施。

请遵循以下预防措施，保护您的孩子免受 COVID-19 影响：

- 让您的孩子及时接种最新 COVID-19 疫苗，包括在符合资格的情况下接种加强针。
- 在 COVID-19 社区风险等级较高的区域以及要求戴口罩的其他区域（如医疗机构），建议 2 岁及以上儿童进入室内时佩戴口罩。
- 了解 COVID-19 对您家人的风险，以帮助您做出明智的决定，确保您的安全和健康。
- 确保您的孩子勤洗手，用肥皂和水洗手不少于 20 秒。
- 避免与患者接触。
- 如果您的孩子患上 COVID-19 重症的风险较高，请与医生讨论可供采取的额外保护措施。



查看有关 MIS-C 的更多信息

- 访问 DHS 网站: www.dhs.wi.gov/disease/mis-c.htm
- 访问 Centers for Disease Control and Prevention（美国疾病控制与预防中心）网站: www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/children/mis-c.html

