

Síndrome inflamatorio multisistémico en niños (MIS-C)

(Multisystem Inflammatory Syndrome in Children (MIS-C))

Información para padres

Sobre el MIS-C

El síndrome inflamatorio multisistémico en niños (MIS-C) es una condición rara, pero grave asociada al COVID-19. El MIS-C puede causar la inflamación del corazón, los pulmones, los riñones, el cerebro, la piel, los ojos o los órganos gastrointestinales.

Qué causa el MIS-C

Todavía estamos aprendiendo qué causa el MIS-C. Sabemos que los niños que tienen MIS-C tuvieron COVID-19 o estuvieron en contacto estrecho con alguien con COVID-19. El MIS-C es grave, pero los niños que reciben un diagnóstico se recuperarán si reciben atención médica a tiempo.

Si cree que su hijo tiene MIS-C

Si su hijo presenta síntomas del MIS-C, comuníquese con un médico o proveedor de atención médica. Si no consigue un médico o un proveedor de atención médica, comuníquese con el 211 en [211wisconsin.communityos.org](https://www.211wisconsin.communityos.org) para que le comuniquen con recursos que puedan ayudarlo.

Síntomas del MIS-C

- Dolor abdominal
- Sarpullido
- Cansancio
- Diarrea
- Fiebre
- Dolor de cuello
- Vómitos
- Ojos inyectados de sangre

Llame al 911 o diríjase a la sala de emergencias inmediatamente si su hijo presenta alguno de los siguientes **signos de advertencia de emergencia:**



- Dificultad para respirar
- Dolor o presión en el pecho que no desaparece.
- Labios o cara descoloridos
- Incapacidad de despertarse o mantenerse despierto
- Confusión nueva
- Dolor abdominal intenso



Diagnóstico y tratamiento del MIS-C

Es posible que un médico u otro proveedor de atención médica hagan distintos exámenes en busca de la inflamación tales como los siguientes:

- Ultrasonido abdominal
- Análisis de sangre
- Radiografía de tórax
- Ecocardiograma (ultrasonido del corazón)

Los niños con MIS-C deberán recibir tratamiento en un hospital y pueden ser admitidos en la unidad de cuidados intensivos pediátricos.

Los médicos le pueden dar medicamentos o fluidos a su hijo para hacer que se sienta mejor y para tratar la inflamación.

Proteja a su hijo del COVID-19

La mejor forma de prevenir el MIS-C es tomar medidas para proteger a su hijo del COVID-19. Sabemos que es posible que algunas personas no tengan los privilegios y los recursos que les permitan llevar a cabo prácticas de prevención.

Para proteger a su hijo del COVID-19, lleve a cabo las siguientes prácticas de prevención:

- Mantenga a su hijo al día con las vacunas contra el COVID-19, incluidas las dosis de refuerzo si su hijo califica.
- Incentive a los niños de 2 años o más a usar una mascarilla en lugares cerrados en zonas con niveles comunitarios altos de COVID-19 y en otras zonas donde se requieren mascarillas (tales como lugares de atención médica).
- Comprenda los riesgos del COVID-19 para su familia, lo que le ayudará a tomar decisiones informadas para mantener a su familia sana y salva.
- Asegúrese de que su hijo se lave las manos frecuentemente con agua y jabón durante al menos 20 segundos.
- Evite estar cerca de personas enfermas.
- Hable con su médico sobre las medidas adicionales que puede tomar para proteger a su hijo si corre un mayor riesgo de enfermarse de gravedad a causa del COVID-19.



Encuentre más información en MIS-C

- Visite el sitio web de Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en: www.dhs.wi.gov/disease/mis-c.htm
- Visite el sitio web de los Centers for Disease Control and Prevention (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) en: www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/children/mis-c.html

