

Hepatitis C: Información para personas embarazadas y puérperas

(Hepatitis C: Information for pregnant and post-partum people)



La hepatitis C se puede transmitir al bebé durante el embarazo o el parto. Ocurre en solo 1 de cada 20 bebés nacidos de personas embarazadas con hepatitis C. No obstante, la madre y el bebé pueden vivir una vida larga y gozar de buena salud con tratamiento.



La hepatitis C se transmite a través del contacto de sangre con sangre.



Es seguro abrazar, besar y jugar con su bebé si tiene hepatitis C.



Utilice preservativos durante el embarazo y haga que su pareja se realice pruebas.



Informe a un médico si tiene hepatitis C.

Todos deben hacerse la prueba de hepatitis C durante cada embarazo. Puede ser importante hacerse la prueba varias veces durante el embarazo si tiene ciertos factores de riesgo, como la exposición regular a la sangre en el trabajo o a través del consumo de drogas.

Pruebas y tratamiento para su bebé

- Su bebé puede hacerse la prueba a los 2 meses con una prueba confirmatoria de ARN o a los 18 meses con una prueba de anticuerpos. **Su pediatra puede determinar qué prueba es adecuada para su bebé.**
- Los niños pueden recibir tratamiento contra la hepatitis C cuando tengan 36 meses de edad o más. Más del 95% de los pacientes se curan con tratamiento.
- [iConsulte nuestro sitio web](http://www.dhs.wisconsin.gov/viral-hepatitis/hcv-program.htm) para obtener más información! (www.dhs.wisconsin.gov/viral-hepatitis/hcv-program.htm)

Puede recibir tratamiento contra la hepatitis C después de dar a luz.

Si está tomando medicamentos, hable con su médico sobre las formas más seguras de proporcionarle leche materna a su bebé.

