



¿VIAJA?




PROTÉJASE PRIMERO CONTRA EL SARAMPIÓN.



Antes de viajar **fuera del país o dentro de los Estados Unidos**, asegúrese de estar al día con su vacuna contra measles-mumps-rubella (el sarampión, las paperas y la rubéola, MMR).

BEBÉS

Entre 6 y 11 meses



Viaje dentro de los EE. UU.

No hay recomendación de vacunación MMR para este grupo

Viaje fuera del país

Consulte al proveedor de cuidados de la salud de su niño sobre la vacunación MMR

NIÑOS

Entre 12 meses y 13 años



Viaje dentro de los EE. UU.

Siga el programa de rutina:

- ◆ 1 dosis de la MMR a los 12-15 meses
- ◆ 1 dosis a los 4-6 años

Viaje fuera del país

2 dosis de la MMR con al menos 28 días de diferencia

ADOLESCENTES Y ADULTOS

Sin evidencia de inmunidad*



Viaje dentro de los EE. UU.

Adolescentes y adultos:

- ◆ 1 dosis de la MMR ahora
- Adolescentes:
 - ◆ 1 dosis al menos 28 días después

Viaje fuera del país

2 dosis de la MMR con al menos 28 días de diferencia

*La evidencia de inmunidad incluye una de las siguientes opciones: la documentación escrita de vacunación, la evidencia de inmunidad de laboratorio, la confirmación de laboratorio de sarampión o el nacimiento en los Estados Unidos antes de 1957.

Planifique estar completamente vacunado contra el sarampión **al menos 2 semanas antes de viajar**. Si faltan menos de 2 semanas para su viaje, aun así debe recibir una dosis de la **vacuna MMR**, si se recomienda.

BUREAU OF COMMUNICABLE DISEASES

Wisconsin Department of Health Services | Division of Public Health

<https://www.dhs.wisconsin.gov/dph/bcd.htm> | DHSDPHBCD@dhs.wi.gov

