

Vacuna Tdap y embarazo

(Tdap Vaccine and Pregnancy)

Puede comenzar a proteger a su bebé contra la tosferina ahora.



La tos convulsa, también conocida como tosferina, es una enfermedad que causa una tos severa que dificulta la respiración. La tosferina puede afectar a las personas a cualquier edad, pero es más grave en bebés y niños pequeños. La tosferina puede hacer que los bebés dejen de respirar. Los bebés son demasiado pequeños para que reciban su propia vacuna, por lo que dependen de los adultos que los rodean para ayudar a protegerlos. Recibir la vacuna Tdap durante el embarazo puede ayudar a proteger a su bebé de la tosferina.

La tosferina se esparce fácilmente de una persona a otra y los bebés están en mayor riesgo.



La tosferina se esparce por el aire cuando una persona enferma tose. Puede ser difícil distinguir la diferencia entre la tosferina y un resfriado, por lo que es importante que las personas que se encuentran en un mayor riesgo de infección, como los bebés y los niños pequeños, estén protegidos.



La vacuna Tdap es una forma segura y efectiva de proteger a su bebé contra la tosferina.

La vacuna Tdap se ha probado exhaustivamente y es segura para usted y para su bebé. No se puede enfermar de tosferina a causa de la vacuna. Los profesionales del cuidado de la salud que se especializan en el cuidado de las personas embarazadas, como las parteras y matronas, coinciden en que es importante recibir la vacuna Tdap.

Se recomienda que reciba la vacuna Tdap durante cada embarazo.



La vacuna Tdap proporciona la mayoría de la protección dos semanas después de su aplicación, pero el nivel de protección disminuye con el paso del tiempo. Es por ello que se debe vacunar durante cada embarazo, a fin de que cada uno de sus bebés tenga la mejor protección contra la enfermedad.

Si recibe la vacuna Tdap durante el tercer trimestre, su bebé nacerá con protección contra la tosferina.



Al recibir la vacuna Tdap en su tercer trimestre, puede comenzar a construir la protección de su bebé antes de que nazca. Esta protección ayudará a mantener al bebé a salvo en el lapso entre el nacimiento y el momento en que esté listo para su primera vacuna contra la tosferina. Es importante que usted reciba la vacuna Tdap antes de que nazca el bebé, ya que los recién nacidos están en mayor riesgo de enfermarse en los primeros meses después del nacimiento.



Es seguro amamantar después de recibir la vacuna Tdap.

La vacuna Tdap no afecta la seguridad de la lactancia materna. De hecho, al vacunarse durante el embarazo, podrá seguir compartiendo protección contra la tosferina en cuanto ingiera su leche. Si espera hasta que su bebé nazca para recibir la vacuna Tdap, su bebé no estará protegido.

Puede ser elegible para recibir la vacuna Tdap de manera gratuita a través del programa de Vaccines for Adults (Vacunas para adultos).



El programa Vaccines for Adults (Vacunas para adultos) brinda vacunas gratuitas para las personas que reúnen ciertos criterios como no tener seguro o tener un seguro que no cubra el costo de la vacunación. La mayoría de los departamentos de salud locales y tribales son proveedores de Vaccines for Adults (Vacunas para adultos). Contacte a su departamento de salud para obtener más información.

dhs.wi.gov/lh-depts/counties/index.htm

Más información



BUREAU OF COMMUNICABLE DISEASES

Wisconsin Department of Health Services | Division of Public Health
<https://www.dhs.wisconsin.gov/dph/bcd.htm> | DHSDPHBCD@dhs.wi.gov

P-03685S (12/2024)