

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE LA INFANCIA EN WISCONSIN: OJOS, OÍDOS, NARIZ y GARGANTA

Nombre de la enfermedad (también conocida, agente causante)	Se propaga por	Periodo de incubación (tiempo desde la exposición hasta que aparecen los síntomas)	Signos y síntomas	Periodo de tiempo en el que una persona es contagiosa	Criterios de exclusión de la escuela o grupo
Herpes labial (virus del herpes simple)	Contacto directo con lagas abiertas o saliva	De 2 días a 2 semanas	Fiebre ¹ , irritabilidad, ampollas en la boca, encías o labios	Durante al menos 1 semana después de la aparición de los síntomas; es posible la excreción del virus a niveles bajos después de la desaparición de los síntomas.	Excluir hasta que el niño no tenga fiebre durante 24 horas sin utilizar medicamentos antifebriles y puede controlar el babeo mientras haya ampollas en el interior de la boca.
Mononucleosis Infecciosa (mono, mononucleosis VEB)	Contacto de persona a persona con la saliva.	De 30 a 50 días	Fiebre ¹ , dolor de garganta, inflamación de los ganglios linfáticos, fatiga, agrandamiento del hígado o del bazo.	Muchos meses después de la infección; la excreción del virus puede producirse de forma intermitente durante toda la vida.	Ninguna, a menos que la enfermedad impida la participación; no se permiten deportes de contacto hasta que el bazo ya no esté agrandado.
 Paperas (virus de las paperas)	Inhalación de gotitas respiratorias, contacto directo con saliva de la persona infectada	De 12 a 25 días; normalmente de 16 a 18 días	Fiebre ¹ , hinchazón y sensibilidad de las glándulas parótidas, dolor de cabeza, dolor de oídos, testículos hinchados y dolorosos, dolor abdominal con ovarios hinchados.	De 2 días antes a 5 días después de la hinchazón	<u>Excluir durante 5 días después del inicio de la inflamación (el día del inicio de la inflamación es el día cero); excluir a los contactos de riesgo² desde el día 12 hasta el día 25 después de la exposición.</u>
Conjuntivitis bacteriana o vírica	Contacto de persona a persona; contacto de las manos con los ojos y secreciones infectadas de los ojos, la nariz o la boca de una persona infectada, o superficies contaminadas.	Variable según el organismo causante.	Bacterias: ojos rojos o rosados, secreción ocular verde o amarilla Virus: ojos rosados e hinchados, sensibilidad a la luz	Mientras haya signos y síntomas	Ninguno, salvo fiebre ¹ o cambio de comportamiento, no se requieren antibióticos para el retorno
Faringitis estreptocócica y escarlatina (faringitis estreptocócica, estreptococo del grupo A)	Contacto con gotitas respiratorias infecciosas y saliva, contacto directo con secreciones de la boca o la nariz.	De 2 a 5 días	Dolor de garganta, fiebre, dolor de cabeza, ganglios linfáticos inflamados y sensibles, disminución del apetito, escalofríos y sudores.	Hasta 12 horas después del inicio del tratamiento antibiótico adecuado	Excluir durante al menos 12 horas tras el inicio del antibiótico apropiado y sin fiebre durante al menos 24 horas sin el uso de medicamentos antifebriles.

Medidas de control y prevención en el lugar

Para todas las enfermedades: Buen lavado de manos e higiene; evitar besos, compartir bebidas o utensilios, utilizar desinfección adecuada de superficies y juguetes.

Paperas: Proporcionar los registros de vacunación de las personas expuestas a los funcionarios de salud pública.

Faringitis estreptocócica: Evitar besarse, compartir bebidas o utensilios; excluir a los manipuladores de alimentos infectados; minimizar el contacto con secreciones respiratorias y orales.

 Vacuna disponible para prevenir enfermedades



Se debe informar a los departamentos de salud estatales y locales

BUREAU OF COMMUNICABLE DISEASES

Wisconsin Department of Health
Services | Division of Public Health

P-44397AS (03/2024)



¹Fiebre=temperatura de 100.4 °F o más, independientemente de la vía por la que se tome (boca, recto, axila, oído, frente). Solo tómele la temperatura a un niño si parece estar enfermo.

²En riesgo o mayor probabilidad de enfermarse = Personas no vacunadas, con sistemas inmunitarios comprometidos o embarazadas

³Entornos de alto riesgo = Atención médica, cuidado infantil, servicio de comidas

Tres criterios clave para la exclusión: La mayoría de las enfermedades infantiles no requieren exclusión. El cuidador o maestro debe determinar si la enfermedad 1) impide que el niño participe cómodamente en las actividades, 2) genera una necesidad de cuidados superior a la que el personal puede proporcionar sin comprometer la salud y la seguridad de los demás niños, o 3) presenta un riesgo de propagación. Si se cumple alguno de estos criterios, el niño debe ser excluido, independientemente del tipo de enfermedad.

Esta tabla de información sobre enfermedades contagiosas seleccionadas tiene como único fin servir de guía para responder a las preguntas que suelen hacer las personas responsables de grupos de niños en guarderías, escuelas, campamentos de verano u otras situaciones similares. La tabla no pretende ser una lista exhaustiva de enfermedades importantes ni una guía completa de toda la información sobre cada enfermedad. Puede obtener información más específica sobre estas u otras enfermedades en su agencia de salud pública local o en:

<https://www.dhs.wisconsin.gov/disease/childhood-communicable-diseases.htm>