








ENFERMEDADES TRANSMISIBLES INFANTILES DE WISCONSIN: INFECCIONES DE TRANSMISIÓN

Nombre de la enfermedad (también conocida, agente causante)	Se propaga por	Periodo de incubación (tiempo desde la exposición hasta que aparecen los síntomas)	Signos y síntomas	Periodo de tiempo en el que una persona es contagiosa	Criterios de exclusión de la escuela o grupo
<p>Clamidia  (<i>Chlamydia trachomatis</i>)</p> <p>Gonorrea (<i>Neisseria gonorrhoea</i>) </p>	Contacto sexual, bebés en el parto, mucosidad o secreción ocular	De 2 a 14 días o más para la clamidia	Conjuntivitis neonatal, neumonía, infecciones del tracto genital, secreción purulenta de uretra o cérvix, embarazo ectópico, enfermedad pélvica inflamatoria, puede ser asintomática.	Hasta 2 semanas después del inicio del tratamiento o meses si no se trata	Ninguno
<p>Chancro (<i>Haemophilus ducreyi</i>) </p>	Contacto sexual, contacto con llaga(s)	De 3 a 5 días	Llagas genitales dolorosas, glándulas sensibles	De 1 a 2 semanas después del inicio del tratamiento	Ninguno
<p>Sífilis congénita  (<i>Treponema pallidum</i>)</p>	A través del torrente sanguíneo de una persona embarazada con sífilis a su bebé en el útero.	En cualquier momento durante el embarazo	Es posible que los bebés no presenten síntomas o presenten sarpullido, rinitis (moqueo), manchas blancas en la boca, dientes o huesos deformados, recuento sanguíneo muy bajo, agrandamiento del hígado o del bazo, ictericia (coloración amarillenta de la piel o los ojos), aborto espontáneo o muerte fetal.	Los bebés pueden infectarse si la persona embarazada tiene una infección no tratada durante el embarazo; es poco probable que los bebés transmitan la infección a otras personas.	Ninguno
<p>Herpes simple (virus del herpes simple)</p>	Contacto piel con piel, como durante los besos; sexo oral, anal y vaginal y contacto sexual; bebés en partos vaginales	De 2 a 12 días	Pueden reaparecer ampollas en o alrededor de genitales, recto, boca;	La mayoría de las veces es contagiosa entre 2 y 7 semanas después de la infección primaria; incluso si una persona no presenta ningún síntoma, aún puede ser contagiosa.	Ninguno
<p>VPH (virus del papiloma humano) </p>	Contacto sexual o contacto con verrugas cutáneas	3 meses a varios años	Verrugas cutáneas planas o elevadas, verrugas con forma de coliflor en la zona anogenital	Desconocido	Ninguno

Nombre de la enfermedad (también conocida, agente causante)	Se propaga por	Periodo de incubación (tiempo desde la exposición hasta que aparecen los síntomas)	Signos y síntomas	Periodo de tiempo en el que una persona es contagiosa	Criterios de exclusión de la escuela o grupo
Sifilis (<i>Treponema pallidum</i>) 	Contacto sexual, contacto con llaga(s)	De 10 a 90 días	Llaga genital indolora, sarpullido en el cuerpo, las palmas de las manos, las plantas de los pies, llagas o manchas blancas en la boca o la vagina.	De 1 a 2 semanas después del inicio del tratamiento o de meses a años si no se trata; es más contagiosa cuando hay llagas	Ninguno

Medidas de control y prevención en el lugar

Para todas las enfermedades: Evitar que otras personas toquen las lesiones y las secreciones; mantener una buena higiene personal y de las manos.

 Vacuna disponible para prevenir enfermedades



Se debe informar a los departamentos de salud estatales y locales

¹**Fiebre**=temperatura de 100.4 °F o más, independientemente de la vía por la que se tome (boca, recto, axila, oído, frente). Solo tómele la temperatura a un niño si parece estar enfermo.

²**En riesgo o mayor probabilidad de enfermarse** = Personas no vacunadas, con sistemas inmunitarios comprometidos o embarazadas

³**Entornos de alto riesgo** = Atención médica, cuidado infantil, servicio de comidas

Tres criterios clave para la exclusión: La mayoría de las enfermedades infantiles no requieren exclusión. El cuidador o maestro debe determinar si la enfermedad 1) impide que el niño participe cómodamente en las actividades, 2) genera una necesidad de cuidados superior a la que el personal puede proporcionar sin comprometer la salud y la seguridad de los demás niños, o 3) presenta un riesgo de propagación. Si se cumple alguno de estos criterios, el niño debe ser excluido, independientemente del tipo de enfermedad.

Esta tabla de información sobre enfermedades contagiosas seleccionadas tiene como único fin servir de guía para responder a las preguntas que suelen hacer las personas responsables de grupos de niños en guarderías, escuelas, campamentos de verano u otras situaciones similares. La tabla no pretende ser una lista exhaustiva de enfermedades importantes ni una guía completa de toda la información sobre cada enfermedad. Puede obtener información más específica sobre estas u otras enfermedades en su agencia de salud pública local o en:

<https://www.dhs.wisconsin.gov/disease/childhood-communicable-diseases.htm>

BUREAU OF COMMUNICABLE DISEASES

Wisconsin Department of Health
Services | Division of Public
Health

P-44397FS (03/2024)

